



اضطراب الاكتئاب وعلاقته بالإدمان على المخدرات في ضوء بعض
المتغيرات لدى عينة من المدمنين بمجمع إرادة والصحة النفسية في
مدينة الدمام

**Depression Disorder and its Relationship with Drugs
Addiction in Light of Some Variables Among a Sample of
Addicts at Iradah and Mental Health center in Dammam**

إعداد الباحث
نايف عبد العزيز هذال الدوسري

رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير
(علم النفس / علم النفس الجنائي)

إشراف سعادة الأستاذ الدكتور
السيد خالد إبراهيم مطحنة

كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة الملك عبد العزيز
المملكة العربية السعودية

٢٠٢٢/١٤٤٤

المستخلص

هدفت الدراسة للتعرف على علاقة اضطراب الاكتئاب بالإدمان على المخدرات في ضوء بعض المتغيرات لدى عينة من المدمنين بمجمع إرادة والصحة النفسية في مدينة الدمام، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي باستخدام أسلوب الدراسة الارتباطية المقارنة، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المدمنين على المخدرات في مجمع إرادة والصحة النفسية في مدينة الدمام والبالغ عددهم (٥٠٠) مدمناً على المخدرات، وتم اختيار العينة بالطريقة القصدية لمناسبتها لهدف الدراسة، تكونت العينة من (١٢٠) من المدمنين على المخدرات في مجمع إرادة والصحة النفسية في مدينة الدمام، وقسم الباحث العينة إلى عينة استطلاعية للتأكد من الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة وبلغ عددها (٢٠) مدمناً على المخدرات، وإلى عينة رئيسية بلغ عددها (١٠٠) من المدمنين على المخدرات، و(١٠٠) من غير المدمنين على المخدرات، بعد ذلك قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة (مقياس بيك للاكتئاب Beck Depression Inventory) بصورته النهائية على عينة الدراسة، وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة بين الاكتئاب والإدمان على المخدرات حيث جاءت قيمة الارتباط مرتفعة (٠,٦٦٠) وبدلالة إحصائية (٠,٠١١)، وهذا يشير إلى أن هناك علاقة طردية بين الاكتئاب وبين الإدمان، كما أن المتوسطات الحسابية لمستوى اضطراب الاكتئاب لدى عينة مدمني المخدرات تراوحت ما بين (٣٠ - ١,١٦) حيث جاء المتوسط الحسابي الكلي "٧٣"، بدرجة منخفضة وبانحراف معياري "٠,٤٨"، كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية "٧٣" في الاكتئاب بين المدمنين وغير المدمنين حيث جاءت قيمة $t = ٣,٦٣٧$ وبدلالة إحصائية (٠,٠٠٣)، وهذا يشير إلى أن الفئة المدمنة أكثر اكتئاباً من الفئة غير المدمنة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في الاكتئاب لدى مجموعة المدمنين تبعاً (للعمر، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي)، بينما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاكتئاب تبعاً لمتغيري (عدد سنوات الإدمان، عدد مرات التنويم)، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاكتئاب تبعاً لمتغير نوع المخدر لصالح فئة "كحول".

وأوصت الدراسة بضرورة الحرص على الدور التثقيفي والتوعوي حول مخاطر المخدرات وتأثيرها على الأفراد في المجتمع، وضرورة حرص إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية في مدينة الدمام في معالجة الاكتئاب لدى المدمنين على المخدرات من خلال تأهيل الأخصائيين النفسيين وتوظيفهم في المجمع.

الكلمات المفتاحية: اضطراب الاكتئاب، الإدمان على المخدرات، المدمنين، مجمع إرادة والصحة النفسية في مدينة الدمام.



اضطراب الاكتئاب وعلاقته بالإدمان على المخدرات في ضوء بعض
المتغيرات لدى عينة من المدمنين بمجمع إرادة والصحة النفسية في
مدينة الدمام

**Depression Disorder and its Relationship with Drugs
Addiction in Light of Some Variables Among a Sample of
Addicts at Iradah and Mental Health center in Dammam**

إعداد الباحث
نايف عبد العزيز هذال الدوسري

رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير
(علم النفس / علم النفس الجنائي)

إشراف سعادة الأستاذ الدكتور
السيد خالد إبراهيم مطحنة

كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة الملك عبد العزيز
المملكة العربية السعودية

٢٠٢٢/١٤٤٤

Abstract

The study aimed to identify the relationship of depression disorder with drug addiction in the light of some variables among a sample of addicts at Irada and Mental Health CENTER in Dammam. To achieve the objectives of the study, the descriptive approach was used using the comparative correlative study method, where the study population consisted of all drug addicts in Irada and Mental Health CENTER in Dammam, who numbered (500) addicted to drugs. The researcher divided the sample into an exploratory sample to ascertain the psychometric characteristics of the study tools, which numbered (20) drug addicts, and into a main sample of (100) drug addicts, and (100) non-drug addicts. Then, Therefore, the researcher applied the study tool (Beck Depression Inventory) in its second form to the study sample, and the results concluded that there is a depression relationship between depression and drug addiction, where the correlation value was high (0.660) and statistically significant (0.011), This indicates that there is a direct relationship between depression and addiction, and the arithmetic averages of the level of depressive disorder among a sample of drug addicts ranged between (.30 - 1.16), where the The overall arithmetic mean of ".73" with a low degree and a standard deviation of "0.48", as it was found that there is a depression relationship between addicts and non-addicts, where the correlation value was high (0.861) and statistically significant (0.003), T-value= 3.637, and this indicates that the addicted group is more depressed than the non-addicted group . The results also showed that there were no differences between depression and the variable of (age, marital status, educational qualification), while it was found that there was a direct statistically significant relationship between depression and the two variables (number of years of addiction) (number of times of hypnosis), and there were statistically significant differences in the dimension Depression according to the variable of drug type in favor of the "alcohol" category.

The study recommended the necessity of paying attention to the educational and awareness role about the dangers of drugs and their impact on individuals in the community, and the necessity of keenness of the administration of Irada and Mental Health Complex in Dammam in treating depression among drug addicts through the rehabilitation of psychologists and their employment in the complex.

Keywords: Depressive disorder, drug addiction, addicts, Irada complex and mental health in the city of Dammam.